

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК*

Дети/возраст	24 ч	3-7 дн.	1 мес	2 мес	3 мес	4,5 мес	6 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	6 лет	6-7 лет	14 лет	15-18 лет	
ГРИПП																ЕЖЕГОДНО
Туберкулез (БЦЖ-М/БЦЖ)		V											RV			
Гепатит В	V1		V2	V3**			V3	V4**								
Пневмококковая инфекция (ПКВ)				V1		V2			RV							
Гемофильная инфекция (Hib)					V1**	V2**	V3**			RV**						
Коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС)					V1	V2	V3			RV1						
Дифтерия, столбняк (АДС-М)													RV2	RV3		
Полиомиелит (ИПВ/ОПВ)					V1 ИПВ	V2 ИПВ	V3** ИПВ			RV1** ИПВ	RV2** ИПВ			RV3** ИПВ		
							V3 ОПВ			RV1 ОПВ	RV2 ОПВ			RV3 ОПВ		
Корь, краснуха, паротит (ККП)								V				RV				

Взрослые/возраст	18-25 лет	от 18 до 35 лет	18-55 лет	56 лет и старше
Краснуха (однократно)	Женщины не болевшие, не привитые, привитые однократно			
Корь (V1 и V2 с интервалом не менее 3-х месяцев)	Не болевшие, не привитые, привитые однократно против кори			
Гепатит В	Не привитые ранее			
АДС-М	Каждые 10 лет от момента последней ревакцинации			
ГРИПП. ВАКЦИНАЦИЯ С ПЛЮСОМ!	ГРИПП. ЕЖЕГОДНО			
	<ul style="list-style-type: none"> + Беременные женщины + Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений + Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям + Лица, подлежащие призыву на военную службу 		<ul style="list-style-type: none"> + Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением + Взрослые старше 60 лет 	

V1, 2, 3 — порядковый номер вакцинации, RV — ревакцинация, ИПВ — инактивированная полиомиелитная вакцина, ОПВ — оральная полиомиелитная вакцина
 * Утвержден приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» ** Дети из группы риска

Гриппол® плюс

Вакцина для профилактики гриппа у детей в возрасте от 6-ти месяцев, женщин во 2-м и 3-м триместрах беременности и взрослых



ВАКЦИНА ГРИППОЗНАЯ ТРИВАЛЕНТНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ ПОЛИМЕР-СУБЪЕДИНИЧНАЯ

СОСТАВ. Одна иммунизирующая доза (0,5 мл) содержит не менее чем по 5 мкг гемагглютинаина эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и типа В и 500 мкг иммуноадьюванта Полиоксидоний® в фосфатно-солевом буфере; **не содержит консервантов.**

ПОКАЗАНИЯ. Специфическая профилактика гриппа **у детей с 6 месяцев**, подростков и взрослых без ограничения возраста. Вакцина особенно показана детям дошкольного возраста, школьникам; детям и взрослым, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным; лицам старше 60 лет; медработникам; работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции; военнослужащим и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины. Острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии). Лицам, ранее имевшим аллергические реакции на введение гриппозных вакцин.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ. Вакцина гриппозная инактивированная полимер-субъединичная не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. Наиболее безопасна вакцинация во втором и третьем триместрах. Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Вакцина является высокоочищенным препаратом. Хорошо переносится детьми и взрослыми. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило, отсутствуют. Редко в месте введения могут развиваться реакции в виде болезненности, отека и покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно через 1-3 дня. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, парестезия, неврологические расстройства.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Детям от 6 до 35 месяцев включительно вакцину вводят в дозе 0,25 мл двукратно с интервалом 3-4 недели в переднебоковую поверхность бедра внутримышечно. Детям старше 36 месяцев, подросткам и взрослым вакцину вводят в дозе 0,5 мл однократно внутримышечно или глубоко подкожно в дельтовидную мышцу. Ранее не болевшим гриппом и невакцинированным детям возможно двукратное введение вакцины с интервалом 3-4 недели. Пациентам с иммунодефицитом и получающим иммуносупрессивную терапию возможно двукратное введение вакцины по 0,5 мл с интервалом 3-4 недели.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Не вводить внутривенно!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. Вакцина Гриппол® плюс может применяться одновременно с инактивированными и живыми вакцинами Национального календаря профилактических прививок (за исключением БЦЖ и БЦЖ-М) и инактивированными вакцинами календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям (за исключением антирабической). Препараты следует вводить в разные участки тела разными шприцами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Не замораживать! Препарат, подвергшийся замораживанию, применению не подлежит.

СРОК ГОДНОСТИ. 12 месяцев. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО «НПО Петровакс Фарм». Полный текст инструкции – в упаковке.